

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
03.09.14 № 616

Реєстраційне посвідчення
№ UA/2351/01/02

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ®
(CARBODERM-DARNITSA)

Склад:

діюча речовина: сечовина;

1 г крему містить 100 мг сечовини;

допоміжні речовини: цетилпіридинію хлорид, пропіленгліколь, олія мінеральна, спирт цетостеариловий, вода очищена.

Лікарська форма. Крем.

Основні фізико-хімічні властивості: однорідний крем білого кольору без запаху.

Фармакотерапевтична група.

Препарати з пом'якшувальною та захисною дією. Сечовина. Код АТХ D02A E01.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Крем Карбодерм-Дарниця® чинить гідратуючу, кератолітичну, протисвербіжну, антибактеріальну та протигрибкову дію. Внаслідок застосування крему зменшуються прояви гіперкератозу, пом'якшується та зволожується шкіра, підвищується її еластичність, покращується епітелізація поверхневих пошкоджень. Сечовина препарату у концентрації 10 % діє бактерицидно та фунгіцидно завдяки цетилпіридинію хлориду, що входить до складу препарату. За рахунок слабкої місцевоанестезуючої дії сечовини препарат чинить протисвербіжну дію.

Фармакокінетика.

Високомолекулярні полімерні речовини мазевої основи утримують сечовину на поверхні місця нанесення, запобігають її трансдермальному всмоктуванню, завдяки цьому сечовина не потрапляє у системний кровотік.

Клінічні характеристики.

Показання.

Лікування захворювань шкіри, що супроводжуються підвищеним утворенням зроговілого епітелію.

Препарат застосовувати для лікування псоріазу (у стаціонарній стадії при значній інфільтрації), себореї, кератомікозів, гіперкератозів, гіперкератичних форм екземи, іхтіозу.

ОРИГІНАЛ

Протипоказання.

Застосування крему Карбодерм-Дарниця® протипоказане при підвищеній індивідуальній чутливості до сечовини або до інших компонентів крему, а також при дерматозах, що супроводжуються вираженою ексудацією.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Відомостей щодо взаємодії крему Карбодерм-Дарниця® з іншими препаратами немає, однак слід враховувати, що одночасне застосування крему з іншими мазями або кремами може призвести до посилення всмоктування лікарських речовин, що входять до їх складу (особливо кортикостероїдів).

Не рекомендується одночасне застосування інших препаратів, що містять сечовину та її похідні.

Особливості застосування.

Слід уникати потрапляння препарату в очі та на слизові оболонки.

Для запобігання впливу на здорові тканини бажано щоб ділянка шкіри, на яку слід наносити крем, не перевищувала розмір ураженої зони.

Не застосовувати для лікування гострого запалення ушкодженої шкіри.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат застосовувати у період вагітності або годування груддю за призначенням лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Препарат слід застосовувати для лікування дорослих.

Дозу крему лікар призначає індивідуально залежно від типу захворювання, ступеня ураження та розміру ураженої ділянки. Крем (у середньому 1-4 см) наносити тонким шаром на уражену ділянку шкіри 2 рази на добу. Для підвищення ефективності лікування можна застосовувати оклюзійні пов'язки.

Тривалість лікування, що може становити у середньому 1-2 тижні, визначає лікар індивідуально залежно від виду і тяжкості захворювання, з урахуванням регресії симптомів інфільтрації та ліхеніфікації шкіри.

Діти.

Препарат не призначати дітям через відсутність клінічного досвіду.

Передозування.

Випадків передозування препарату Карбодерм-Дарниця® не зафіксовано.

При випадковому проковтуванні великої кількості препарату та виникненні симптомів інтоксикації необхідно звернутися до лікаря.

Побічні реакції.

У поодиноких випадках можливий розвиток дерматологічних реакцій: почервоніння шкіри, свербіж, поколювання і подразнення шкіри. Можливі місцеві алергічні реакції, включаючи контактний дерматит.

Зрідка можлива поява відчуття печіння, що частіше виникає при накладанні оклюзійної пов'язки.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу